




# Apesin COMBI DR



## Απολυμαντικό και καθαριστικό προϊόν γενικής χρήσης βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο

### Σύνθεση:

100gr Apesin Combi DR περιέχουν: 7,5g N-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, <5% ανιονικά και μη ιονικά τασιενεργά, NTA. 5εν περιέχει άρωμα. pH: περίπου 9.

### Ιδιότητες:

Απολυμαίνει και καθαρίζει σε μία φάση. Το Apesin Combi DR είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την απολύμανση επιφανειών και εξοπλισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μέθοδο καθαρισμού σε σπρέι, εμβάπτισμού ή χειρονακτικής απολύμανσης. Γρήγορα και αξιόπιστα αφαιρεί κάθε τύπου βρομιά. Υψηλή ικανότητα προσκόλλησης της βρομιάς. Το Apesin Combi DR αφαιρεί αξιόπιστα τη βρομιά ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και υπολείμματα μεγάλου φορτίου πρωτεΐνης.

### Περιοχή Εφαρμογής:

Χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη απολύμανση και τον καθαρισμό όλων των επιφανειών που πλένονται, για παράδειγμα σε catering και χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Το Apesin Combi DR είναι επίσης κατάλληλο για κρύους χώρους αποθήκευσης και πάγκους εργασίας. Έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί σύμφωνα με:

\* Ακόμη και με υψηλό φορτίο σε πρωτεΐνες Έχει επίσης πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 1040, 1275, 1650, 13697 (Candida albicans) και EN 14476 (influenza A, H3N8).

### Εφαρμογή:

Χρησιμοποιείται ανάλογα με τον ανωτέρω πίνακα εφαρμογής (προτεινόμενη διάλυση ανά μικροβιακό φορτίο και χρόνο δράσης). Για ολοκληρωτικό καθαρισμό και απολύμανση της επιφάνειας η προτεινόμενη διάλυση είναι 2% (20ml/Lt νερού) με χρόνο αναμονής 30 λεπτά. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το διάλυμα χρήσης ως το τέλος του. Να τηρείτε το χρόνο δράσης. Για τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα απαιτείται ξέπλυμα με πόσιμο νερό πριν την επαναχρησιμοποίησή τους.

### Προφυλάξεις κατά τη χρήση:

**ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ!** Περιέχει N-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη. Προκαλεί εγκαύματα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πάντοτε να διαβάζετε τις πληροφορίες της ετικέτας και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πριν τη χρήση του.

	5 min	15 min	30min	60min	240min
DGHM-VAH, low org. Load with mechanic		1,5%	1%	0,5%	0,25%
DGHM-VAH, high org. Load with mechanic		2%	1,5%	1%	0,5%
DVG (6. list) less loaded area A+B 10°+20°			1%		
DVG (6. list) loaded area A+B 10°+20°				1%	
Hep. B/HIV			2%		
Salmonella	0,25%				
TBC				0,5%	
Vaccina viruses		2%			
Hep. C (BVDV)	0,5%				
Avian Influenza A-virus H3N8			0,5%		

